

Ficha Técnica

Nombre del producto	CLOTRIMAZOL CREMA TÓPICA 1%		
Registro ISP	F-24535	Condición de venta	Receta Médica en Establecimientos Tipo A y B.
Forma Farmacéutica	Crema	Código ATC	D01AC01
Presentación	Caja unidad	Vía de administración	Oral
Descripción de envase	Caja de cartulina, plegable, impresa y/o etiquetada con un tubo de aluminio colapsible con recubrimiento epóxico, plegable, con tapa rosca de color blanca, impreso y/o etiquetado con 20g.	Condiciones de almacenamiento	No más de 30° C.
		Periodo de eficacia	36 meses

- **COMPOSICIÓN:**

- Cada gramo de crema tópica contiene:
- Clotrimazol 10 mg
- Excipientes c.s.
- Metilparabeno, Propilparabeno, Alcohol cetoestirilico, ceomacrogol, Parafina Liquina, Parafina blanca, Acido agua purificada.

- **1.- ¿PARA QUÉ SE USA?**

- Este medicamento está indicado para el tratamiento tópico del pie de atleta (tinea pedis), tiña inguinal (tinea cruris) y tiña (tinea corporis)

- **2.- ADMINISTRACIÓN (tópica)**

- **Rango y frecuencia**
- El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es: aplicar la crema en la zona afectada 2-3 veces al día. Continuar la aplicación 1 a 2 semanas luego de desaparecidos los síntomas. La duración del tratamiento es variable. Si los síntomas no desaparecen o empeoran debe consultar con su médico.
- Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no se cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.



- **Consejo de cómo administrarlo**
 - Lave la zona afectada antes de administrar el medicamento, para eliminar escamas y restos de último tratamiento. No debe usar vendajes que no permitan transpirar a la zona de infección.
 - **Uso prolongado**
 - En general se utiliza solo en tratamientos cortos de 1 a 14 días. No debe usarlo por más o menos tiempo que el señalado por su médico.
- **3.-PRECAUCIONES**
 - **Mayores de 60 años**
No existen recomendaciones especiales para los pacientes geriátricos.
 - **Manejo de vehículos**
Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta
 - **Embarazo**
 - Este medicamento se absorbe en cantidades mínima, y es poco probable que dañe al feto.
 - **Lactancia**
 - Este medicamento puede ser absorbido (aunque en pequeñas cantidades) por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando.
 - **Lactantes y niños**
 - El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta con su pediatra. No existen precauciones especiales en el caso del clotrimazol tópico.
 - **Precauciones especiales**
 - Para conseguir una curación completa de la infección es muy importante que complete el tratamiento descrito por su médico, en términos de frecuencia y días de utilización, aunque los síntomas hayan desaparecidos antes.
 - Debe evitar el contacto de la crema con los ojos
 - Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.
- **4.- USTED NO DEBE USAR ESTE MEDICAMENTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:**
 - Si ha presentado síntomas de alergia al clotrimazol u otro antifúngico azólico.
 - Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación



- **5.- INTERACCIONES**

- **Medicamentos**

- Usted debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicar sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo. Precaución en el uso concomitante de otros productos tópicos (aunque sean cosméticos) en el área afectada, ya que puede afectar la efectividad de clotrimazol.

- **6.- EFECTOS ADVERSOS**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo, consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persiste o se intensifican; irritación local sensación de quemaduras, picazón.

- **7- SOBREDOSIS**

Si se aplica sobre heridas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua o tras la ingestión oral inadvertida. No existe un antídoto específico.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha administrado localmente.

- **8.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

- MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
 - Mantener en su envase original, protegido del calor a temperaturas inferiores a 30°C No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
 - No repita el tratamiento sin indicación médico.
 - No recomiende este medicamento a otra persona.